

૧. એચ.આઈ.વી. / એઈડસ

માણસને જ્યારે એઈડસ થાય છે ત્યારે રોગો સામે પ્રતિકાર કરવાની ફુદરતી શક્તિ ઓછી થઈ જાય છે. એક અંદાજ અનું દર્શાવે છે કે ૨૦૦૬ની સાલમાં ભારતમાં પરીસ લાખ લોકોને એઈડસની જિમારી થઈ છે. આ રોગનાં મુખ્ય કારણો જાળવા જેવા છે. આ રોગનો લોગ બનેલા મોટે ભાગે તર્ફનેતર સંબંધ ધરાવે છે. ઉપરાંત પુરુષ બીજાં પુરુષ સાથે સંબંધ બાંધે તો પણ એઈડસ થવાની શક્યતા વધી જાય છે. ડુસની ફુટેવવાળામાં પણ એઈડસ જોવા મળ્યા છે. એઈડસ મટાડવાની કોઈ સારવાર હાવમાં મળી શકતી નથી.

એચ.આઈ.વી. ગ્રસ્ત વ્યક્તિના શરીરનું લોહીથી ચેપનો ફેલાવો

જેને રોગ થયો હોય તેનું લોહી બીજલને ચટાવવામાં આવે તેમજ એચ.આઈ.વી. ગ્રસ્ત વ્યક્તિના શરીરમાંથી અન્ય પ્રવાહીઓ જેવા કે વીર્ય, થોનિસ્ટ્રાવ, એચ.આઈ.વી. ગ્રસ્ત માતાનું ધાવણ દ્વારા પણ રોગનો ચેપ લાગવાની શક્યતાઓ રહે છે. એચ.આઈ.વી. થયો હોય તેની રોગનો સામનો કરવાની શક્તિ ગુડપથી ઘટતી જાય છે. આ કારણે તેવી વ્યક્તિને કોઈ પણ રોગ લાગુ પડી જાય અને ટ્યુમર પણ થાય. જે કે એક વાત મહિન્યની છે કે રોઝિંદા સામાજિક વ્યવહારોથી ચેપ લાગે તેનું બનતું નથી. જેવા કે સ્પર્શ કે સાથે જમવા કે બેસવાથી

સારવાર અને રોકવા માટેના ઉપાયો

એચ.આઈ.વી. ગ્રસ્ત વ્યક્તિમાં શરૂઆતમાં કેટલાક સમય સુધી રોગના વિદનો જોવા મળતા નથી. રોગ શરૂ થયા બાદ છ થી આઠ વર્ષ એઈડસના લક્ષણો જોવા મળે છે. આ સમયે તબીબી સારવાર, માનસિક ટેકો અને પરિવારનો સાથ ખુલ જરૂરી છે. એક વિશિષ્ટ સારવાર છે જેનું નામ એન્ટી રીટ્રોવીરલ થેરાપી છે. આ સારવાર લેવાથી વ્યક્તિ વર્ષો સંધી માંદી પડતી નથી અને તેના શરીરમાં રહેલા એચ.આઈ.વી. પ્રમાણમાં ઓછા જોવા મળે છે. આ સારવાર સરકારી દવાખાના / આરોગ્ય કેન્દ્રોમાં મળી શકે છે. પરંતુ યાદ રાખજો આ રોગને મટાડતી સારવાર નથી. આ કારણે જ અમારા રકતદાતાઓને આગ્રહભર્યું સૂચન કરીએ છીએ કે જાતીય જીવન ખુલ સલામત રાખજો. એક જીવનસાથી સાથે જ જાતીય જીવન માણણો. નિરોધધના સાધનો ઉતામ કક્ષાના જ વાપરજો, નશાકારક ડુસ કચારેય ના લેશો અને લોહી લેવાની જરૂર પડે તો પૂરી ખાગીવાળું અને સલામત હોય તે જ લોહી સ્વીકારજો.

