




૨. હિપેટાઈસ બી (ડોઝી કમળો)

એકંકદરે લીવર (યકૃત) માં સોજે આવે તેને હિપેટાઈસ બી થયો કહેવાય છે. આ વાયરસથી લીવરને ચેપ લાગે છે અને જુવનને જોખમાં મુકે તેવો હિપેટાઈસ બી રોગ થાય છે. વિશ્વ આરોગ્ય સંસ્થા (જ.ક.ર.) ના અંદાજ મુજબ એચ.આઈ.વી.ની તુલનામાં હિપેટાઈસ બી ૫૦ થી ૧૦૦ ગણો વધારે ચેપી છે. વિદ્યાર્થી વસ્તીની આશરે ૮ ટકા વસ્તી હિપેટાઈસ બી નો ચેપ ધરાવે છે. દર વર્ષ ૫ લાખ લોકો લીવરના કેન્સર અને લીવરને લગતા ગંભીર રોગોથી મૃત્યુ પામે છે. ભારતમાં આશરે ૪ કરોડ લોકો આ રોગનો ચેપ ધરાવે છે અને આશરે ૧ લાખ આજ કારણે મૃત્યુને ભેટે છે.

રોગાનો ફેલાવો

આ રોગની ચેપી વ્યક્તિના શરીરના લોહી ઉપરાંત અન્ય પ્રવાહીઓ બીજા વ્યક્તિમાં જવાથી થાય છે. એચ.આઈ.વી.ની જેમ જ આ રોગ પણ ચેપ ફેલાવે છે. તેથીય વધુ તે એચ.આઈ.વી. તુલનામાં ૫૦ થી ૧૦૦ ગણો વધારે ચેપી છે કારણ કે હિપેટાઈસ-બી વાયરસ શરીરની બહાર પણ સાત દિવસ સુધી જીવત હોય છે. સાવયેતી વગર વાપરેલી સોંઘ, બાળકને પ્રારંભના દિવસોમાં થતા ચેપ, સાવયેતી વગર લીધેલું અસુરક્ષિત રક્ત, અસલામત જીવન આ જધા કારણો એરો કમળો ફેલાવે છે. અને તે લીવર કેન્સર કે લીવરને લગતા ગંભીર રોગોમાં પરિણામે છે. ચામડી પીળી પડવી, પેટમાં દુઃખાવો રહેવો, ઉલ્ટી - ઉભકા આવવા તે આ રોગના મુખ્ય ચિંઠનો છે.



સારવાર અને રોગને મટાડવો

આ રોગની કોઈ ચોક્કસ દવા નથી અને લીવરનું કેન્સર વો લગભગ ધાતક જ છે. જો કે રસીથી રોગને અટકાવી શકાય છે. હિપેટાઈસ બીની રસી ચેપની સામે અસરકારક રક્ષણ આપી શકે છે. બાળકના જન્મ પછી સમયસર રસીનો પહેલો ડોઝ બાળકને આપવો જોઈસે. જે કોઈને એરો કમળાનું જોખમ જણાતું હોય તેણે ૩ ડોઝ વાળી રસી લેવી જ જોઈસે જે જીવનભર સાચવે છે.

આ ચેપથી સ્વૈચ્છિક રક્તદાતાઓને સલામતી આપવા પ્રથમા જલડ સેન્ટર દ્વારા રસીકરણ કાર્યક્રમ શરૂ કરેલ છે. જે વ્યક્તિએ પ્રથમાંથી પાંચ વાર રક્તદાન કર્યું છે તેમને આ રસી નિઃશુલ્ક આપાય છે. અન્ય વ્યક્તિઓ માટે ડોઝ દીઠ ૫૦ ઇપિયા છે. ડોઝનો ક્રમ નીચે જણાવ્યા પ્રમાણે છે.

૧. પહેલો ડોઝ આપે ,
૨. બીજો ડોઝ એક મહીના પછી,
૩. બીજો ડોઝ પહેલો ડોઝ લીધાના ક મહીના પછી,
૪. જુસ્ટર ડોઝ પહેલો ડોઝ લીધાના પ વર્ષ પછી.